

عمل پانکچر چیست؟

انجام ICSI یا IVF چند مرحله دارد

یکی از آن ها عمل پانکچر یا تخمک گیری است

این مرحله پس از رشد تخمک ها با هورمون درمانی انجام شدنی است

در این عمل معمولاً به برش جراحی نیاز نیست

و تخمک گیری از طریق دیواره واژن با هدایت سونوگرافی و به

وسیله سوزن انجام می شود.

در این روش با سوراخ کردن دیواره

فولیکول ها، محتوای آن ها که تخمک و مایع فولیکولی است، خارج

می شود

راهنمای عمل پانکچر



مرکز باروری رایان

Rayan Fertility Center

مشهد بلوار شاهد نبش شاهد ۶۸

۰۵۱۳۸۴۴۷۲۴۶

www.rayanclinic.com

آمادگی قبل از پانکچر

- یک هفته قبل و دو هفته بعد از تخمک کشی مقاربت ممنوع است، بخصوص در مواردی که تعیین جنسیت جنین انجام می شود
- شما ۳۶ ساعت بعد از تزریق اچ سی جی، عمل پانکچر (تخمک کشی) خواهید داشت
- در صورتی که داروهای قلبی، فشار خون و تیروئید استفاده می کنید، استفاده از آن ها را مطابق معمول ادامه دهید
- در صورت ابتلا به دیابت دستورات لازم را کسب نمایید
- قبل از عمل شام سبک میل کنید و از ساعت ۱۲ شب تا زمان عمل کاملا ناشتا باشید

اقدامات لازم بعد از عمل در صورت عدم انتقال جنین

- مصرف داروها را طبق دستورات پزشک انجام دهید
- در صورت بروز تهوع داروی ضد تهوع استفاده نمایید
- در صورت بروز تهوع و استفراغ شدید، درد شدید زیر شکم ورم شکم یا کاهش ادرار بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید

اقدامات لازم بعد از عمل در صورت انتقال

- تا ۳ ساعت قبل از انتقال مثانه را خالی نمایید
عمل انتقال
- جنین باید با مثانه ی نیمه پر انجام شود
- جهت انتقال جنین نیاز نیست ناشتا باشید
- شب قبل از مراجعه جهت انتقال جنین دوش بگیرید
- تا زمان تجویز پزشک مقاربت ممنوع می باشد

تمام روش های پزشکی با برخی از ریسک ها همراه است

اما چگونه این خطرات به شما اعمال می شود نسبت به دیگران متفاوت خواهد بود

